กรมอนามัย

FLOW CHART แนวทางการปฏิบัติเมื่อบุคลากรถูกของมีคมหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือด ผู้ป่วยตำหรือสารคัดหลั่งกระเด็นถูกผิวหนังที่ไม่ปกติ

- ห้ามบีบ เค้น บริเวณที่สัมผัสให้ล้างด้วยน้ำสะอาด/น้ำสบู่
- ชำระล้างแผลด้วย Hibiscrub ล้างด้วย NSS
-ใช้ 70 % Alcohol เช็ดรอบปากแผล
-ใช้Betadine Solution เช็ดบริเวณแผล

เลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยกระเด็นเข้าปาก

ให้บ้วนทิ้งโดยเร็วที่สุดและล้างปากกลั้วคอด้วยน้ำสะอาด หรือ NSS ให้มากๆ

เลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยกระเด็นเข้าตา

ล้างด้วยน้ำสะอาด หรือ NSS มากๆทันที(2000-3000ml.)

ซักประวัติผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงและส่งผู้ป่วยตรวจเลือด

(แจ้ง LAB ขอผลด่วน)

1.แจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน หรือICN หรือผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มงาน

-ระหว่างรอผลเลือดควร START ยาต้านไวรัสเม็ดแรกก่อนภายใน 2 ชม.(ในกรณีที่เสี่ยงสูง)

2.แจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษา หรือ ICN ซักประวัติรายละเอียดของการสัมผัสและบันทึกหลักฐานใน <u>แบบบันทึกส่วนที่ 1</u>

3.ปรึกษาแพทย์ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ

- หากพิจารณาใช้ยาให้ส่งบุคลากรเจาะเลือดตามแนวทางและให้ยา3วันแรกก่อน เพื่อติดตามการใช้ยา จากนั้นจ่ายครบ 28 วัน

การบันทึกอุบัติการณ์

- สรุปบันทึกความเสี่ยงของอุบัติการณ์เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่อซักถามเพิ่มเติมและนัดตรวจซ้ำ

- กรอกข้อมูลในใบบันทึกให้ครบถ้วนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อผู้ติดตามในภายหลัง

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 6 ม.ค. 2566