

หลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละตัวชี้วัด

คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพสตรี

ระดับความสำเร็จเรื่องคลินิกรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL)เพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (covid -๑๙)

คะแนน	หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑	ระดับที่๑. รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ Assessment :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ และ ประชุมคณะทำงาน(สูติแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย) <u>สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙</u> สถานการณ์การระบาดทั่วโลก กว่า๘ ล้านราย เสียชีวิต กว่า ๔๓๐,๐๐๐ ราย สถานการณ์การระบาดในประเทศไทย ยืนยัน สะสม ๓,๑๓๕ ราย เสียชีวิต ๕๘ ราย <u>ข้อมูล ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่มา: รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ กรมควบคุมโรค</u> ภาพการประชุมวางแผนรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ในหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มาใช้บริการในคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรี  คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรีมีการประชุมร่วมกับสูติแพทย์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันการติดต่อและแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (covid -๑๙)ของหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มาใช้บริการในคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรีแต่เจ้าหน้าที่คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรียังไม่อาจประเมินได้ว่าความรู้และการปฏิบัติตัวในภาวะที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (covid -๑๙)ของหญิงตั้งครรภ์และสามีอยู่ในระดับใด ทางคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรีจึงจัดทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)ในภาวะที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (covid -๑๙)ขึ้น

คะแนน	หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑	ระดับที่ ๒ คั่นคว้าข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ และ การปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (covid -๑๙)  การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และการรกแตก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทย ยังไม่มีข้อมูลว่าหญิงตั้งครรภ์มีโรคติดเชื้อ COVID-19 มากว่าคนทั่วไปหรือไม่ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด กลุ่มปกติ กลุ่มปกติ คือ กลุ่มที่มีดังนี้ ใช้หลักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัด โดย 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ที่มีอาการไอ เป็นไข้ หรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หรือรวมกลุ่มกันจำนวนมาก 2. รักษาระยะห่าง ในการอยู่ร่วมกันบุคคลอื่นหรือการอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร 3. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณตา ปาก และจมูก 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ หรือปรุงอาหารให้สุกก่อนกิน 5. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกับผู้อื่น 6. ถ้ามีไข้บ่อย ๆ ด้วยตนเองหรือจากผู้อื่นภายใน 20 วันที่ หุุดที่ติดมาโดยเจตนา สัมผัสสิ่งแปลกปลอม ก่อนรับประทานอาหาร หรือออกจากห้องน้ำ หากไม่แน่ใจ ให้ใช้ 70% alcohol gel 7. ไม่สวมใส่เสื้อผ้าจากภายนอก ถ้ามีอาการไอ เจ็บ ไอ ให้ใช้ผ้าเช็ดตัวบนมืออย่างถูกต้อง 8. แม้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามหลักความสะอาดอย่างเคร่งครัดแล้ว หากมีอาการป่วย เช่นไข้ คอแห้ง ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ถ้ามีอาการไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ควรไปพบแพทย์ 9. หญิงตั้งครรภ์สามารถฝากครรภ์ได้ตามปกติ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ที่เป็กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ว่า COVID-19 1. หลีกเลี่ยงออกจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อมภายนอก 14 วัน อาการให้เฝ้าระวังเป็นผู้มี  การจัดระบบบริการฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีการขยายไปวงกว้างทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รัฐบาลได้ประกาศ พยายามลดการบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และแจ้งบริการรักษาในโรงพยาบาล เป็นเหตุให้ผู้มีผู้ป่วยจำนวนมากไม่โรงพยาบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการด้านอื่นๆของโรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการฝากครรภ์ด้วย ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการตั้งครรภ์ แม้ว่าผลกระทบของ COVID-19 ต่อการตั้งครรภ์ ยังสรุปไม่ได้ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลที่มีจำกัด แต่อาจคาดการณ์ได้ดังนี้ 1. ผลกระทบทางตรง ต่อหญิงตั้งครรภ์ - การติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะมีอาการและอาการแสดงไม่แตกต่างจากคนทั่วไป คือ ไอ หายใจเหนื่อย และ อาจนำไปสู่อาการปอดอักเสบได้ - การเพิ่มและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ต่อทารก - Fetal distress - Low apgar score - Stillbirth, neonatal death - เชื้อโรคจากมารดาไปสู่ทารก 2. ผลกระทบทางอ้อม - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดมีมากขึ้นทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น และการขาดคนขับรถยนต์อาจทำให้ไม่อาจคาดเดาได้ การเดินทางเข้ารับบริการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อไวรัส COVID-19 V2, 20 April 2020 Management of Covid-19 Infection in Pregnancy V2, 20 April 2020 แนวทางการปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เรื่อง การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 RTCOG Clinical Practice Guideline Management of Covid-19 Infection in Pregnancy เอกสารหมายเลข OB 822 จัดทําโดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562-2564 วันที่อนุมัติโดยฉบับ 26 มีนาคม 2563 ฉบับปรับปรุง Version 2 วันที่ 28 เมษายน 2563 เนื่องจาเชื้อโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังคงมีรายงาน สถานการณ์และแนวทางการดูแลรักษาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แนวทางการปฏิบัตินี้จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ การไม่ปฏิบัติตามแนวทางนี้ให้ถือเป็นความผิดทางปฏิบัติที่ผู้ดูแลต้องรับผิดชอบต่อ คำนำ โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดได้ทั่วโลกจนแพร่กระจายทั่วโลก เกิดจากเชื้อไวรัสตระกูล Corona ชื่อ SARS-CoV-2 มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562⁽¹⁾ การติดต่อส่วนใหญ่ผ่านทางการสัมผัสโดยตรงต่อของเหลวทางเดินหายใจ การจาม การไอ การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในสถานที่ที่ปิดตัว เช่น โรงงาน สถานประกอบการ หรือที่สาธารณะ 83% จะมีไข้ 82% ไอแห้ง 81% หายใจลำบาก 81% ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 80% มีผื่นหรือผื่น 5% เจ็บคอและ 4% หายใจไม่เต็มปอด⁽²⁾ รายงานการตรวจพบระยะเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจและเชื้อไวรัสได้ ผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบ 81% จะเกิด acute respiratory distress syndrome (ARDS) และ 71% จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ⁽³⁾ 61.5% ของผู้ป่วยมีอาการภายใน 28 วัน ระยะเวลาเฉลี่ยหลังจากเชื้อไวรัสถูกวินิจฉัยถึงเสียชีวิต 7 วัน⁽⁴⁾ อัตราส่วนการเสียชีวิต (Crude fatality rate) ที่พบร้อยละ 4.2 (95% CI, 3.9-4.5) ในเมืองอู่ฮั่น ร้อยละ 1.8 (95% CI, 1.6-2.0) ในเมืองอื่น ๆ นอกอู่ฮั่นของจีน⁽⁵⁾ และร้อยละ 0.43 (95% CI, 0.32-0.57) ในพื้นที่อื่น ๆ นอกจีน⁽⁶⁾

คะแนน	หลักฐานประกอบการพิจารณา			
	ส่วนที่ ๑ (ต่อ)จากข้อมูลหลักฐานทางการแพทย์ในปัจจุบัน ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง			
	ลำดับ ที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
	๘	เชื้อโควิด - ๑๙ สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในท้องหรือติดระหว่างการคลอดได้		
	๙	แม่ที่ติดเชื้อโควิด - ๑๙ ไม่สามารถให้นมลูกได้ เนื่องจากพบเชื้อโควิด - ๑๙ ในน้ำนม		
	๑๐	ตรวจไม่พบเชื้อโควิด - ๑๙ ในน้ำคร่ำและน้ำนมในแม่ที่ติดเชื้อโควิด - ๑๙		
	๑๑	การป้องกันการติดเชื้อโควิด - ๑๙ ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อย ๆ เลี่ยงสถานที่ชุมชนและสถานที่แออัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รักษาสุขภาพให้แข็งแรง		
	๑๒	การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคโควิด - ๑๙ ได้ดีกว่าน้ำและสบู่		
	๑๓	เมื่อออกจากบ้านหรือเคหสถานต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด - ๑๙		
	๑๔	การไม่สัมผัสพื้นผิว ตา จมูก ปาก ช่วยลดการติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙		
	๑๕	ควรระวังการติดเชื้อโควิด - ๑๙ จากบุคคลแปลกหน้า บุคคลที่ไม่รู้จักและชาวต่างชาติเท่านั้นไม่จำเป็นต้องระวังกับบุคคลใกล้ชิด บุคคลในครอบครัวหรือคนคุ้นเคย		
	ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติตัวในภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ต่อไปนี้ท่านปฏิบัติในข้อใดบ้าง			
	ลำดับ ที่	การปฏิบัติตัว	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
	๑	เลี่ยงที่มีคนแออัด แหล่งชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า , ตลาดสด , ตลาดนัด , โรงพยาบาล และร้านอาหาร		
	๒	เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ - ๒ เมตร		
	๓	เลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น เช่น ไม่ทักทายโดยการจับมือ , การกอด , การหอม		
	๔	ซื้อสินค้า ทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การโอนเงิน , ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต		
	๕	เลี่ยงติดต่อบุคคลอื่นโดยตรง ใช้วิธีผ่านโทรศัพท์โปรแกรมแชท Line , Messenger , Program Zoom		
	๖	เลี่ยงการเดินทางในพาหนะที่แออัด เช่น รถประจำทาง , รถตู้สาธารณะ, และแท็กซี่		
	๗	ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ หลังใช้มือปิดปากตอนไอจาม , หลังใช้ห้องน้ำ , ก่อน - หลังทานอาหาร , หลังใช้มือจับสิ่งของสาธารณะ เช่น ราวบันได มือจับ หรือลูกบิดประตู ลิฟท์ โตะ - แก้วสาธารณะ		

คะแนน	หลักฐานประกอบการพิจารณา			
๑	ส่วนที่ ๒ (ต่อ)การปฏิบัติตัวในภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ต่อไปนี้ท่านปฏิบัติในข้อใดบ้าง			
	ลำดับ ที่	การปฏิบัติตัว	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
	๘	เลี่ยงการจับสิ่งของสาธารณะ เช่น ราวบันได , มือจับลูกบิดประตู , โต๊ะ , แก้ว		
	๙	ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากเคหสถานตลอดเวลา		
	๑๐	ทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้เช่น โต๊ะทำงาน , ของใช้ส่วนตัว , โทรศัพท์มือถือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด/แอลกอฮอล์เป็นประจำ		
	๑๑	หลังจากออกไปแหล่งชุมชน เมื่อกลับถึงบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที		
	๑๒	ออกกำลังกายสม่ำเสมอ		
	๑๓	พักผ่อนให้เพียงพอ		
	๑๔	ทานอาหารดี มีประโยชน์ งดอาหารดิบ รับประทานอาหารร้อน ประสุกใหม่ ๆ		
	๑๕	เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก ตา		
ส่วนที่ ๓ ในระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา ท่านทำกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น เท่าเดิม หรือน้อยลง (หากน้อยลงเพราะเหตุใด)				
๑. การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น ๑ - ๒ เมตร ☐ มากขึ้น ☐ เท่าเดิม ☐ น้อยลง เพราะ.....				
๒. ใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ☐ มากขึ้น ☐ เท่าเดิม ☐ น้อยลง เพราะ.....				
๓. เลี่ยงไปในที่ชุมชน หรือสถานที่แออัด/ที่ปิดทึบ เช่น ตลาด , ห้างสรรพสินค้า , ร้านอาหาร , คลับ/บาร์ , โรง ภาพยนตร์ , รถโดยสารสาธารณะ (รถไฟฟ้า รถตู้ รถแท็กซี่) เครื่องบิน ☐ มากขึ้น ☐ เท่าเดิม ☐ น้อยลง เพราะ.....				
๔. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ☐ มากขึ้น ☐ เท่าเดิม ☐ น้อยลง เพราะ.....				
๕. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นเช่น การจับมือ , การกอด , การหอม ☐ มากขึ้น ☐ เท่าเดิม ☐ น้อยลง เพราะ.....				
๖. ซื้อสินค้า - บริการ ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ☐ มากขึ้น ☐ เท่าเดิม ☐ ไม่เคยทำ ☐ น้อยลง เพราะ.....				

คะแนน

หลักฐานประกอบการพิจารณา

ส่วนที่ ๓ ในระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา ท่านทำกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น เท่าเดิม หรือน้อยลง (หากน้อยลงเพราะเหตุใด)(ต่อ)

๗. ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น Line Messenger , WhatsApp , Skype , WeChat

☐ มากขึ้น

☐ เท่าเดิม

☐ น้อยลง

๘. ทำงานจากที่บ้าน (Work from home)

☐ มากขึ้น

☐ เท่าเดิม

☐ ไม่ได้ทำ (ทำเฉพาะในที่ทำงาน)

☐ น้อยลง


ระดับที่ ๓ เก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพถ่ายหญิงตั้งครรภ์และสามีทำแบบสอบถาม



ภาพถ่ายแบบสอบถามการปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙


[illegible][illegible][illegible]

คะแนน	หลักฐานประกอบการพิจารณา																																
๑	ระดับที่ ๔ นำข้อมูลจากแบบถามมาวิเคราะห์ จากการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มาใช้บริการที่คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมสุขภาพสตรีตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๕๗ ราย แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ ๑๔๔ ราย สามี ๑๑๓ ราย ผลการศึกษาแสดงดังแผนภูมิต่อไปนี้ ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 <table border="1" data-bbox="365 556 1477 1123"><thead><tr><th>ข้อ</th><th>ร้อยละของผู้ตอบถูก</th></tr></thead><tbody><tr><td>ข้อ 1</td><td>96.89</td></tr><tr><td>ข้อ 2</td><td>14.01</td></tr><tr><td>ข้อ 3</td><td>57.98</td></tr><tr><td>ข้อ 4</td><td>96.89</td></tr><tr><td>ข้อ 5</td><td>9.73</td></tr><tr><td>ข้อ 6</td><td>33.85</td></tr><tr><td>ข้อ 7</td><td>17.51</td></tr><tr><td>ข้อ 8</td><td>18.68</td></tr><tr><td>ข้อ 9</td><td>21.79</td></tr><tr><td>ข้อ 10</td><td>49.03</td></tr><tr><td>ข้อ 11</td><td>96.11</td></tr><tr><td>ข้อ 12</td><td>21.01</td></tr><tr><td>ข้อ 13</td><td>100.00</td></tr><tr><td>ข้อ 14</td><td>96.11</td></tr><tr><td>ข้อ 15</td><td>38.91</td></tr></tbody></table> <u>ส่วนที่ ๑</u> ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ จำนวนทั้งหมด ๑๕ ข้อ แยกเป็น ข้อ๑-๕ เป็นกลุ่มความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ข้อ๖-๑๐ เป็นกลุ่มความรู้ด้านผลของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ต่อการตั้งครรภ์ ข้อ๑๑-๑๕ เป็นกลุ่มความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ - ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย ๗.๖๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๕ (สูงสุด ๑๔ ต่ำสุด ๓) - ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ๑-๕ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๗๕ - ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ๖- ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ย ๑.๔๑ - ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ๑๑-๑๕ ได้คะแนนเฉลี่ย๓.๕๒ แสดงให้เห็นว่าหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มาใช้บริการที่คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมสุขภาพสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ยังไม่ตื่นักโดยเฉพาะในด้านผลของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ต่อการตั้งครรภ์ (ข้อ๖-๑๐) มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอาการและการติดต่อของ โรค(ข้อ ๒,๕,๑๒,๑๕)	ข้อ	ร้อยละของผู้ตอบถูก	ข้อ 1	96.89	ข้อ 2	14.01	ข้อ 3	57.98	ข้อ 4	96.89	ข้อ 5	9.73	ข้อ 6	33.85	ข้อ 7	17.51	ข้อ 8	18.68	ข้อ 9	21.79	ข้อ 10	49.03	ข้อ 11	96.11	ข้อ 12	21.01	ข้อ 13	100.00	ข้อ 14	96.11	ข้อ 15	38.91
ข้อ	ร้อยละของผู้ตอบถูก																																
ข้อ 1	96.89																																
ข้อ 2	14.01																																
ข้อ 3	57.98																																
ข้อ 4	96.89																																
ข้อ 5	9.73																																
ข้อ 6	33.85																																
ข้อ 7	17.51																																
ข้อ 8	18.68																																
ข้อ 9	21.79																																
ข้อ 10	49.03																																
ข้อ 11	96.11																																
ข้อ 12	21.01																																
ข้อ 13	100.00																																
ข้อ 14	96.11																																
ข้อ 15	38.91																																


คะแนน

หลักฐานประกอบการพิจารณา

การปฏิบัติตัวในภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด-19



ส่วนที่ ๒ ประเมินการปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ของหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มาใช้บริการที่คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมสุขภาพสตรี จำนวนทั้งหมด ๑๕ ข้อ พบว่าหญิงตั้งครรภ์และสามีมีการปฏิบัติตัวได้ดีเกือบทุกด้าน เช่น การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชน หลีกเลี่ยงการสัมผัส หน้า ตา จมูก ปาก (ปฏิบัติมากกว่าร้อยละ ๙๐) พบการปฏิบัติน้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ในเรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ ๘๗.๑๖) และการออกกำลังกาย (ร้อยละ ๘๐.๑๖)

คะแนน	หลักฐานประกอบการพิจารณา																																				
	พฤติกรรมในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา <table><thead><tr><th>กิจกรรม</th><th>มากขึ้น</th><th>เท่าเดิม</th><th>น้อยลง</th></tr></thead><tbody><tr><td>เป็นระฆัง</td><td>61.48</td><td>35.80</td><td>2.33</td></tr><tr><td>ใส่น้ำยาก</td><td>69.65</td><td>29.96</td><td>0.39</td></tr><tr><td>เล่นที่ชุมชน</td><td>63.04</td><td>31.52</td><td>5.45</td></tr><tr><td>ล้างมือบ่อยๆ</td><td>75.10</td><td>24.12</td><td>0.78</td></tr><tr><td>เล่นการสัมผัสผู้อื่น</td><td>70.43</td><td>26.07</td><td>3.50</td></tr><tr><td>ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต</td><td>55.29</td><td>41.18</td><td>3.53</td></tr><tr><td>สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต</td><td>58.75</td><td>39.69</td><td>1.56</td></tr><tr><td>Work From Home</td><td>35.90</td><td>57.26</td><td>6.84</td></tr></tbody></table> ส่วนที่ ๓ เปรียบเทียบการปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ของหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมสุขภาพสตรี ในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา เพื่อประเมินว่า หญิงตั้งครรภ์และสามีละเลย ในการปฏิบัติตัวในด้านใดหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า มีการปฏิบัติตัวลดลงในเรื่อง การทำงานที่บ้าน (work from home) และการหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชน (ปฏิบัติลดลงร้อยละ ๖.๘ และ ๕.๔๕ ตามลำดับ) ซึ่งน่าจะเป็นผลจาก ในช่วงเก็บข้อมูลเป็นช่วงคลายล็อกดาวน์มาตรการการป้องกันการติดเชื้อของทางราชการ แต่หญิงตั้งครรภ์และสามี ยังคงมีการ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ อย่างเคร่งครัด (ปฏิบัติลดลงร้อยละ ๐.๓๙ และ ๐.๗๘ ตามลำดับ) ซึ่งแสดงว่าหญิงตั้งครรภ์และสามียังคงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันโรคนี้อยู่	กิจกรรม	มากขึ้น	เท่าเดิม	น้อยลง	เป็นระฆัง	61.48	35.80	2.33	ใส่น้ำยาก	69.65	29.96	0.39	เล่นที่ชุมชน	63.04	31.52	5.45	ล้างมือบ่อยๆ	75.10	24.12	0.78	เล่นการสัมผัสผู้อื่น	70.43	26.07	3.50	ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต	55.29	41.18	3.53	สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต	58.75	39.69	1.56	Work From Home	35.90	57.26	6.84
กิจกรรม	มากขึ้น	เท่าเดิม	น้อยลง																																		
เป็นระฆัง	61.48	35.80	2.33																																		
ใส่น้ำยาก	69.65	29.96	0.39																																		
เล่นที่ชุมชน	63.04	31.52	5.45																																		
ล้างมือบ่อยๆ	75.10	24.12	0.78																																		
เล่นการสัมผัสผู้อื่น	70.43	26.07	3.50																																		
ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต	55.29	41.18	3.53																																		
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต	58.75	39.69	1.56																																		
Work From Home	35.90	57.26	6.84																																		

คะแนน

หลักฐานประกอบการพิจารณา

ระดับที่ ๕ นำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาแผนการสอน HL๓เรื่องของหญิงตั้งครรภ์

จากผลการศึกษาพบว่าเนื้อหาที่ต้องเพิ่มในแผนการสอนเดิม(แผนHL๑-๓) จะเน้นความรู้ด้านผลของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ต่อการตั้งครรภ์ การติดต่อ อาการและความรุนแรงของโรค การล้างมือด้วยสบู่ดี เทียบเท่าเจลออกออล ส่วนการปฏิบัติตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้นการสอนจึงต้องเน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง(การ์ดอย่าตก) เนื่องจากปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยเพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศไทย เช่น เมียนมาร์ และมาเลเซีย ซึ่งยังค้นพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก

คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมสุขภาพสตรีได้นำผลการศึกษามาพัฒนาทำสื่อการสอนรูปแบบ Info Graphic เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองด้วย

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดูแลหญิงตั้งครรภ์

หลีกเลี่ยงการไอหรือเสมหะ ปากและจมูก

ล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้าง

รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร

หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้มีอาการไอ จาม เหนื่อยหอบ/มาจากกลุ่มเสี่ยง / สถานที่แออัด

รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่

หากสัมผัสจากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

หากมีไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบควรรีบพบแพทย์

ฝากครรภ์ได้ตามปกติ

กลุ่มเสี่ยง

- เบื้องต้น สังเกตอาการ 14 วัน
- ถ้ามีไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ หรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยงให้พบแพทย์ทันที
- กรณีเจ็บครรภ์คลอด ปวดเมื่อย / ถ้าครบกำหนดฝากครรภ์

ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ กักตัวระหว่างพักตัว 14 วัน

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

รอบรู้สุขภาพ
คุณ กรมอนามัย

ติดต่อ: 1669 หรือ 11222 (สายด่วนสุขภาพดี) | เว็บไซต์: 1669 หรือ 11222 (สายด่วนสุขภาพดี) | โทรศัพท์: 1669 หรือ 11222 (สายด่วนสุขภาพดี)

